NOTÍCIAS

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO

MESMO AS CRIANÇAS QUE JÁ ESTÃO COM ESQUEMA VACINAL COMPLETO DEVEM SER LEVADAS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA RECEBER MAIS UM REFORÇO



Publicado em 20/08/2018 às 21:35 (Atualizado em 24/11/2026 às 01:19), postado por Silvia Goulart - ImppactMidia, Fonte: Câmara de Ibatiba

Crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 devem ser levadas aos postos de saúde para receber a dose contra a pólio e também contra o sarampo. Até o dia 31 de agosto, a vacinação segue diariamente na Unidade de Saúde Adilão Almeida de Lima - Nesf (próxima ao Fórum) e nas demais unidades, incluindo a zona rural.

Este ano, a vacinação será feita de forma indiscriminada, ou seja, pretende imunizar todas as crianças na faixa etária estabelecida. Isso significa que mesmo as que já estão com esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receber mais um reforço.

No caso da pólio, crianças que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida devem receber a VIP. As que já tomaram uma ou mais doses devem receber a VOP. E, para o sarampo, todas devem receber uma dose da Tríplice Viral ? desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Sarampo

A doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, é transmitida pela fala, tosse e o espirro, e extremamente contagiosa, mas pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade do quadro, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano. Em algumas partes do mundo, a doença é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos.

Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o certificado de eliminação da circulação do vírus. Atualmente, entretanto, o país enfrenta surtos de sarampo em Roraima e no Amazonas, além de casos já identificados em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Rondônia e no Rio de Janeiro.

Pólio

Causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, a poliomielite geralmente atinge crianças com menos de 4 anos de idade, mas também pode contaminar adultos. A maior parte das infecções apresenta poucos sintomas, e há semelhanças com infecções respiratórias ? como febre e dor de garganta ? e gastrointestinais ? como náusea, vômito e prisão de ventre.

Cerca de 1% dos infectados pelo vírus desenvolve a forma paralítica da doença, que pode causar sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em alguns casos, levar à morte.

AUTENTICAÇÃO
bde3dbf6e89d3d6acb1bb6c15e49fc07
https://ibatiba.es.leg.br/noticia/2018/08/campanha-de-vacinacao-contra-polio-e-sarampo-ate-o-dia-31-de-agosto.html